



Cobb 500 Broiler

Futterempfehlung



	Starterfutter	Mastfutter I	Mastfutter II	Endmastfutter*
Empfohlene Futtermenge/Tier g	180	700	1.350	-
Rohprotein %	21-22	19-20	18-19	17-18
Energie (metabolisch) WPSA MJ/kg	12,70	13,00	13,30	13,30
Energie (metabolisch) WPSA kcal (AMEn)	3.033	3.105	3.176	3.176
Lysin (verdaulich) %	1,22	1,12	1,02	0,97
Methionin (verdaulich) %	0,46	0,45	0,42	0,40
Met+Cys (verdaulich) %	0,91	0,85	0,80	0,76
Tryptophan (verdaulich) %	0,20	0,18	0,18	0,17
Threonin (verdaulich)	0,83	0,73	0,66	0,63
Arginin (verdaulich)	1,28	1,18	1,07	1,02
Valin (verdaulich)	0,89	0,85	0,76	0,73
Isoleucin (verdaulich)	0,77	0,72	0,67	0,64
Kalzium %	0,90	0,84	0,76	0,76
Phosphor (verfügbar) %	0,45	0,42	0,38	0,38
Natrium %	0,16 - 0,23	0,16 - 0,23	0,16 - 0,23	0,16 - 0,23
Chlorid %	0,16 - 0,30	0,16 - 0,30	0,16 - 0,30	0,16 - 0,30
Kalium %	0,60 - 0,95	0,60 - 0,95	0,60 - 0,95	0,60 - 0,95
Linolsäure %	1,00	1,00	1,00	1,00

* ohne Kokzidiostatika, Wartezeit beachten.

Mit unserer Futterempfehlung ist es möglich ein kontrolliertes und gesundes Wachstum mit konstanter Gewichtsentwicklung zu erreichen.





Cobb 500 Broiler

Gewichtsempfehlung



Tag	Gewicht (g)	tägliche Zunahme (g)	Tag	Gewicht (g)	tägliche Zunahme (g)
0	42		28	1.785	100
1	55	13	29	1.886	101
2	71	16	30	1.988	102
3	90	19	31	2.092	104
4	113	23	32	2.198	106
5	140	27	33	2.304	106
6	167	27	34	2.411	107
7	197	30	35	2.519	108
8	233	36	36	2.627	108
9	272	39	37	2.736	109
10	316	44	38	2.845	109
11	370	54	39	2.954	109
12	430	60	40	3.062	108
13	493	63	41	3.170	108
14	557	64	42	3.278	108
15	623	66	43	3.384	106
16	693	70	44	3.490	106
17	770	77	45	3.595	105
18	851	81	46	3.699	104
19	934	83	47	3.801	102
20	1.019	85	48	3.902	101
21	1.109	90	49	4.001	99
22	1.202	93	50	4.099	98
23	1.296	94			
24	1.391	95			
25	1.487	96			
26	1.585	98			
27	1.685	100			

